

## Strategia Globală pentru eliminarea cancerului de col uterin

lansată în 17 noiembrie 2020 de  
**Organizația Mondială a Sănătății (OMS)**  
printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări.

Obiectiv: până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și să se mențină la **sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei.**

Atingerea obiectivului ar fi posibilă dacă sunt îndeplinite 3 ținte esențiale:

▪ 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani

▪ 70% din femeile adulte să fie testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani


▪ 90% din femeile cu teste pozitive să beneficieze de tratament al leziunilor pre-canceroase și al celor maligne

90%

70%

90%

## România are cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin în Uniunea Europeană (2020)



Incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin în țările UE, 2022, ASR/‰00 femei (raportat la populația standard europeană 2013)  
[https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical\\_cancer\\_en-Nov\\_2021.pdf](https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical_cancer_en-Nov_2021.pdf)

Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat Strategia globală de accelerare a eliminării cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2030.

### CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

1

#### Prevenirea prin vaccinare

Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung împotriva cancerului cervical.

2

#### Screening și tratament al leziunilor pre-canceroase

Pot preveni dezvoltarea leziunilor pre-canceroase în cancer.

3

#### Tratamentul precoce pentru cancerul cervical invaziv

Poate salva vieți!

\* Pentru a elimina cancerul cervical, toate țările trebuie să atingă și să mențină o incidență sub 4 cazuri per 100 000 femei.

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

IANUARIE 2024

## CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Informează-te!  
Testează-te!  
Vaccinează-te!



Material adresat populației generale




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



Institutul Național de Sănătate Publică

## CE ESTE cancerul de col uterin (cancerul cervical)?



Cancerul care apare în celulele colului uterin (partea inferioară a uterului care se conectează la vagin) din cauza înmulțirii necontrolate, haotice a unor celule anormale, cel mai frecvent .în prezența HPV.

## CINE ESTE LA RISC de a dezvolta cancer cervical?

- Toate femeile care și-au început viața sexuală, sunt la risc de a dezvolta cancer cervical.
- Cel mai frecvent femei în vârstă de 35-44 ani

## CE SIMPTOME ARE cancerul de col uterin?

- În mod obișnuit nu există simptome în stadiile precoce.
- Când apar, simptomele pot include:
  - ❖ Sângerări vaginale anormale
  - ❖ Scurgeri vaginale anormale
  - ❖ Durere la contactul sexual
- Aceste simptome apar și în alte afecțiuni , fără a semnifica neapărat un cancer de col uterin.
- În cazul în care apar, adresați-vă imediat medicului!

## CARE ESTE CAUZA cancerului de col uterin?

- Peste 90% din cazuri sunt cauzate de infecția cu HPV
- HPV se transmite în special prin contact sexual
- 8 persoane din 10 se infectează cu HPV în cursul vieții
- În majoritatea cazurilor infecția se va vindeca de la sine, și nu vor dezvolta niciodată cancer cervical.
- Uneori, infecția HPV persistentă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase.
- Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer.
- Intre infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani (chiar zeci).
- Infecția cu HPV nu prezintă simptome

## CANCERUL DE COL UTERIN POATE FI PREVENIT? Da, cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti HPV și screening!



**Vaccinarea și screening-ul pot salva vieți!**

### Infecția HPV poate cauza și dezvoltarea cancerelor de:

- organe genitale (vagin, vulva sau penis), anus
- orofaringeale (cancere ale gurii, ale corzilor vocale)

### INFECȚIA CU HPV poate fi tratată?

- Nu există tratament pentru infecția cu HPV,
- Pot fi tratate efectele produse de infecția HPV.

### HPV nu înseamnă HIV

- Virusul Papilloma Uman (HPV) și Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) sunt viruși foarte diferiți
- HPV și HIV provoacă probleme de sănătate diferite.

## VACCINAREA anti – HPV

### pentru prevenirea cancerului de col uterin

- Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- Riscul de infecție este la fel de mare în cazul fetelor și al băieților.
- Momentul optim pentru vaccinare înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV)

### În România, vaccinarea anti HPV:

- ❖ Este gratuită pentru fete și băieți între 11 ani și 19 ani
- ❖ Este compensată 50% pentru femei între 19 ani și 45 ani

## SCREENING-UL

### pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

- Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 – 64 ani) pentru a depista dacă au leziuni precanceroase;
- Dacă apar leziuni precanceroase, pot fi tratate și nu vor mai evolua către cancer, prevenind astfel apariția cancerului de col uterin!

## RECOMANDĂRI SCREENING

- Femei între 25-29 ani: testul Babeș Papanicolaou
- Femei între 30- 64 ani: testul HPV
- Test efectuat o dată la fiecare 5 ani

**Dacă aveți între 25 și 64 de ani adresați-vă programelor de screening organizat populațional al cancerului de col uterin pentru un test gratuit!**

**Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare și screening și poate fi vindecat dacă este depistat la timp și tratat corespunzător!**