

IANUARIE 2024

CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică

Anual, în lume, sunt
DIAGNOSTICATE
PESTE

600.000

cazuri.

RATA SUPRAVIEȚUIRII LA 5 ANI

DIAGNOSTIC
PRECOCE



91%

DIAGNOSTIC
ÎN STADII AVANSATE



16%

CINE ESTE LA RISC DE CANCER DE COL UTERIN?

Toate femeile, indiferent
de rasă/etnie sunt la risc
de a dezvolta cancer de
col uterin



CEL MAI FRECVENT SUNT
DIAGNOSTICATE FEMEI ÎN
VÂRSTĂ DE

35-44 ANI

CE CAUZEAZĂ CANCERUL DE COL UTERIN?

CEA MAI COMUNĂ CAUZĂ
HPV (HUMAN PAPILOMAVIRUS)



Peste 90% dintre cancerelor
de col uterin sunt cauzate
de infecția cu HPV
Peste 80% din persoane se
infectează cu HPV în cursul
vieții, dar majoritatea nu
vor dezvolta cancer de col
uterin.

CARE SUNT SIMPTOMELE?

În mod obișnuit nu
există simptome în
stadiile precoce de
cancer de col uterin.

ODATĂ CE CANCERUL
AVANSEAZĂ

Simptomele pot include:

SÂNGERĂRI VAGINALE
ANORMALE

SCURGERI VAGINALE
ANORMALE

DURERE LA CONTACTUL
SEXUAL

DE CE ESTE SCREENING-UL CRUCIAL?

6 DIN **10**
CANCERE DE COL
UTERIN

SUNT DEPISTATE LA
FEMEI CARE NU AU
FĂCUT NICIODATĂ UN
TEST
BABEȘ-PAPANICOLAU
sau nu au fost testate
în ultimii 5 ani.