

Comunicat privind creșterea incidenței tusei convulsive în România și recomandări de sănătate publică

Situația epidemiologică în România

În contextul creșterii incidenței tusei convulsive în EU/EEA, au fost înregistrate în România, în primele 4 luni ale anului 2024, 112 cazuri de tuse convulsivă, reprezentând o creștere semnificativă față de 16 cazuri înregistrate în anul 2023, respectiv 93 cazuri media celor 5 ani pre-pandemici (2015-2019).

Au fost înregistrate 2 decese, ambele la sugari.

Cazurile au fost înregistrate în 22 județe ale țării, iar grupa de vârstă cea mai afectată este 0-4 ani. Un procent de 33% dintre cazuri sunt sugari, din care 89% erau eligibili pentru vaccinare.

Din numărul total de 112 cazuri, 78% nu aveau nicio doză de vaccin în antecedente, deși procentul optim era de 95% cu cel puțin o doză de vaccin.

Recomandări pentru populație

1. prezentarea la medic la apariția simptomelor sugestive: accese de tuse intense și prelungite, vomă după accesele de tuse, dificultate în respirație la sugar, inspir zgomotos ("tuse măgărească");
2. vaccinarea la timp a sugarilor și recuperarea restanțierilor;
3. vaccinarea gravidei, în vederea asigurării protecției sugarului mic, dar și a mamei;
4. vaccinarea adultului, cu rapel la fiecare 10 ani;

Amintim că prin Ord.MS nr.3120/2023 vaccinul pentru categoriile menționate la pct. 3. și 4. este compensat 100%.

5. promovarea vaccinării de tip "cocooning" în anturajul sugarului (într-o familie care așteaptă un nou-născut, atât părinții, cât și bunicii și frații sugarului să fie vaccinați conform calendarului național de vaccinare sau recomandărilor pentru adulți).

Director Executiv

Ec Bene Rodica

Sursa INSP

